

Kim jesteśmy?

Cel

Naszym celem jest zwalczanie rozprzestrzeniania się wielolekoopornych czynników chorobotwórczych.

Współuczestnicy akcji

- Westküstenkliniken gGmbH (Heide und Brunsbüttel)
- Kreis Dithmarschen
- St. Georg gGmbH
- St. Johannis gGmbH
- Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
- Pflegeservice Albersdorf
- Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller & Tiessen
- Seniorenresidenz Dethlefsen
- Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
- Haus Uthaven GmbH
- Pflegezentrum Marsch und Geest
- DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-Detlefs-Haus“
- DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöffe“
- DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
- DRK KV-Dithmarschen
- Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
- Pflegeheim Kohlsaar
- Reha-Haus-Buchholz GmbH
- Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
- DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH

www.dithmarschen.sh-mre.de

MRE-Netzwerk Dithmarschen
Esmarchstr. 50, 25746 Heide
Tel. 0481 785 49 00

MRE-sieć w Dithmarschen

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Pieczęć instytucji



Wydanie: 05.2016 | PL

VRE i 3+4 MRGN - Co to jest?



Informacje dla członków rodzin mieszkańców / podopiecznych

dotkniętych zakażeniem wielolekoopornym czynnikiem chorobotwórczym w stacjonarnych zakładach opieki i pod opieką ambulatoryjną

MRE-sieć w Dithmarschen
ZARAZKI ODPORNE NA WIELE LEKÓW

VRE i 3+4 MRGN - Co to jest?

Wiele bakterii, które początkowo nie były szczególnie niebezpieczne dla ludzkiego organizmu, wytworzyło w ostatnich latach odporność na antybiotyki i stało się przez to problemem medycznym. Całkowite zabicie tych bakterii w organizmie ludzkim nie jest obecnie możliwe.

Należy jednak zminimalizować rozprzestrzenianie się ich, konsekwentnie przestrzegając norm higieny.

W Niemczech w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi (te mają specyficzną budowę wewnętrzną) stosuje się 4 różne grupy antybiotyków.

VRE (enterokoki odporne na wankomycynę) to bakterie odporne na jedną z 4 grup antybiotyków. (Wankomycyna należy do grupy antybiotyków glikopeptydowych).

MRGN (wielolekooporne pałeczki Gram-ujemne) to bakterie niewrażliwe (odporne) na kilka grup antybiotyków.

3MRGN są odporne na 3 z 4 istniejących grup antybiotyków.

4MRGN są odporne na 4 z 4 grup antybiotyków. To znaczy na wszystkie.

Jak należy się zachować?

Nie jest konieczne izolowanie chorego, może on uczestniczyć w normalnym życiu towarzyskim.

- **Najważniejsza jest higiena rąk.**
Bo przenoszenie z arazków odbywa się przede wszystkim bezpośredni lub pośredni kontakt ze skórą rąk.
- **Należy co najmniej raz dziennie wycierać deski sedesowe, umywalki, armatury, uchwyty itp. środkiem dezynfekującym.**
- **Osoba zarażona powinna mieć własne artykuły higieny osobistej (np. mydło, środki do pielęgnacji zębów, ręczniki).**
- **Tkaniny należy prać w co najmniej 60° C.**
- **Sztućce i naczynia należy myć w zmywarce w co najmniej 65° C.**
- **W razie zasiedlenia jelita zaleca się, aby chory korzystał z osobnej toalety.**

Co gdzie zrobić?

W przypadku niektórych czynności

(np. odsysania, higieny jamy ustnej) założyć maskę ochronną na nos i usta.

Dezynfekować określone powierzchnie.

W razie potrzeby opatrzyć rany środkiem antyseptycznym.

Tkaniny do prania i odpady usunąć natychmiast po przeprowadzeniu czynności pielęgnacyjnych.

Transport

W razie przeniesienia do szpitala, innego ośrodka opieki lub do gabinetu lekarskiego (również w celu przeprowadzenia badania rentgenowskiego) konieczne poinformować o zasiedleniu lub infekcji.
